

Generalità		Innichner butterkäse (Caciottina Montanara)	
Presentazione	<p><b>Innichner butterkäse (Caciottina Montanara)</b>            Formaggio grasso, a pasta cruda, molle, prodotto tutto l'anno in Alta val Pusteria nel territorio di Innichen (San Candido), con latte vaccino fresco di montagna raccolto a più di 1.000 m s.l.m. ("<i>latte fieno STG</i>"), intero o parzialmente scremato e pastorizzato. È una piccola caciottina cilindrica, con facce leggermente convesse di diametro di 11,5 cm, scalzo di 8 cm leggermente convesso e peso di 0,600 Kg; la crosta è sottile, edibile e senza crepe, di colore giallo paglierino chiaro, più o meno elastica a seconda della stagionatura; la pasta, di colore avorio o giallo paglierino chiaro, con occhiatura minuta e diffusa, a forma di "fessura", ha una consistenza morbida e abbastanza elastica; le sensazioni olfatto-gustative del formaggio sono delicate, piacevolmente fresche e basate su sentori di panna e burro; i sapori sono armonici con assenza di amaro, abbastanza intensi e con una buona persistenza; al palato il prodotto ha una consistenza morbida, quasi burrosa, con una buona solubilità. Le forme maturano per circa 3 settimane in ambienti freschi a 85÷92 %UR, dove vengono rivoltate 2 volte alla settimana. Appena estratte dal magazzino di stagionatura, le forme di formaggio si presentano cosparse da una peluria sottilissima di ife fungine che vengono pulite prima di essere poste sul mercato. È un ottimo formaggio da tavola da accompagnare a verdure alla piastra. Si abbina a vini bianchi o rossi, giovani, secchi, di medio corpo, anche leggermente fruttati.</p>		
	Riconoscimenti	PAT Prov. Autonoma Bolzano	
Produzione	Nazione	Italia	
	Regione	Prov. Autonoma Bolzano	
	Province-Zona	Provincia di <b>Bolzano</b> : territorio dell'Alta Val Pusteria e in particolare nel caseificio di San Candido	
	Tipologie	Conosciuto anche come: " <b>Caciottina montanara o di Innichen</b> "	
Allevamento	Tipo	Stalla, Pascolo. Vacche di razze varie tradizionalmente presenti nel territorio	
	Alimentazione	<p>Il latte utilizzato proviene da animali alimentati al pascolo con erba fresca, o con foraggi affienati dei prati del territorio, con eventuale integrazione di cereali. Viene completamente escluso il ricorso a foraggi insilati e fermentati.</p> <p>Nel comprensorio dell'Alta Val Pusteria, da qualche anno viene portato avanti il progetto "<b>Latte fieno STG</b>". Da secoli il foraggio degli animali viene prodotto con il ritmo delle stagioni: d'estate i contadini mandano il bestiame sui prati ed i vitelli in malga; l'erba viene falciata, seccata e il fieno ottenuto viene portato nei <i>masi</i> per conservarlo durante la stagione fredda.</p> <p>Con la lavorazione dei prati viene così promossa la biodiversità: sui pascoli c'è una grande varietà di erbe (la media è di 30÷50 diversi tipi) che le vacche mangiano conferendo al latte un'ampia varietà di aromi. L'alimentazione delle vacche di cui viene munto il latte, avviene quindi senza mangimi contenenti OGM, insilati, fieni fermentati o balloni fasciati.</p>	
Storia	<p>Il prodotto deve la sua tradizionalità ad una produzione omogenea, di almeno 25 anni, seguendo una lunga ininterrotta tradizione in Alto Adige, soprattutto nelle latterie di malga da cui provengono le locali materie prime</p> <p>La <i>Latteria Sociale di Dobbiaco</i> è stata fondata nel 1883 come una delle prime cooperative dell'Alto Adige. La produzione del formaggio ha quindi una lunga tradizione in Alta Pusteria, soprattutto nella <i>Latteria Tre Cime</i> di San Candido.</p> <p>La tecnologia di produzione della "<i>Caciottina Montanara</i>", è rimasta quasi invariata fino ad oggi.</p> <p><i>Il prodotto è stato iscritto fra i Prodotti PAT della Provincia Autonoma di Bolzano, pubblicati dal MIPAAF nel 21esimo elenco di marzo 2021</i></p>		

Descrizione		Innichner butterkäse (Caciottina Montanara)	
Classificazione	Categoria	PAT	
	Prodotto	Formaggio	
	Materia prima	Latte, Sale	
	Lattifera	Vacca	
	Trattamento latte	Intero o Parzialmente scremato, Pastorizzato	
	Temperatura Cagliata	Crudo	

	<b>Umidità pasta</b>	Molle
	<b>Tecnologia</b>	n.d.
	<b>Stagionatura</b>	Fresco
	<b>Conten. Grasso</b>	Grasso
<b>Geometria forma</b>	<b>Aspetto</b>	Cilindrico
	<b>Facce Dimensioni (Ø)</b>	Leggermente convesse 11,5 cm
	<b>Scalzo Dimensioni</b>	Leggermente convesso 8 cm
<b>Peso</b>	<b>Kg</b>	0,600
<b>Aspetto esterno (Crosta)</b>	<b>Tipo</b>	Pulita Crosta edibile
	<b>Aspetto</b>	Compatta, Senza crepe
	<b>Colore</b>	Giallo paglierino chiaro
	<b>Spessore</b>	Sottile
	<b>Consistenza</b>	Abbastanza morbida, Più o meno elastica a seconda della stagionatura
<b>Aspetto interno (Pasta)</b>	<b>Colore</b>	Avorio o Giallo paglierino chiaro,
	<b>Struttura</b>	Abbastanza Compatta, più o meno morbida ed elastica (secondo stagionatura)
	<b>Occhiatura Forma Dimensione Distribuzione</b>	Presente A forma di "fessura" Minuta Diffusa
<b>Odore / Aroma</b>	<b>Intensità e Persistenza</b>	Medie
	<b>Riconoscimenti</b>	Lattico (panna fresca, burro fresco)
<b>Sapore</b>	<b>Dolce, Salato Acido, Amaro</b>	Armonico, Non amaro
<b>Sensazioni Trigeminale</b>		n.a.
<b>Struttura (in bocca)</b>		Morbida, Quasi burrosa, Buona solubilità
<b>Principali caratteristiche chimico-fisiche</b>	<b>Grasso (% s.s.)</b>	≥ 45 % (formaggio Grasso)
	<b>Grasso (%)</b>	n.d.
	<b>Umidità (%)</b>	

<b>Utilizzo</b>		<b>Innichner butterkäse (Caciottina Montanara)</b>
<b>Utilizzo</b>	<b>In tavola</b>	È un ottimo formaggio da tavola da accompagnare a verdure alla piastra
	<b>In cucina</b>	n.d.
<b>Abbinamenti</b>	<b>Vino</b>	Si abbina a vini bianchi, giovani, secchi, di medio corpo, anche leggermente fruttati
	<b>Pane</b>	n.d.

Produzione		Innichner butterkäse (Caciottina Montanara)			
Periodo produzione		Tutto l'anno			
Materia prima: • Latte • Sale	Lattifere	Vacca	Pecora	Capra	Bufala
	% q.tà	100			
	Provenienza	Stalla, Pascolo			
	Munte	n.d.			
	Trattamenti Fisici	Intero o Parzialmente scremato (4,0 %)			
	Trattamenti Termici	Pastorizzato			
	Aggiunte	Fermenti lattici			
	Preparazione	Il latte preventivamente pastorizzato viene inoculato con i fermenti lattici e portato alla temperatura di coagulazione			
Coagulazione	Temperatura	35+37 °C			
	Tempo (minuti)	n.d.			
	Tipo di caglio	Vitello, liquido o in polvere			
Rottura coagulo	Dimensione	Il coagulo viene rotto alle dimensioni di una nocciola			
Cottura		n.a.			
Formatura e Trattamenti forma		<p>La cagliata viene estratta e sistemata negli appositi stampi, rigirandoli alcune volte fino al giorno successivo</p> <p>Non viene praticata pressatura</p> <p>Tolte dalle fascere, le forme vengono immerse in salamoia</p> <p>Terminata la salatura vengono lasciate asciugare e avviate alla maturazione</p>			
Maturazione e Stagionatura	Tempo	3 settimane			
	°C - UR%	In ambienti freschi e con elevata umidità relativa (85-92 %UR)			
	Cura forme	<p>Durante la maturazione le forme vengono rivoltate 2 volte/settimana</p> <p>Appena estratte dal magazzino di stagionatura, le forme di formaggio sono cosparse da una peluria sottilissima di ife fungine: prima di essere immesse sul mercato le forme vengono pulite</p> <p>Il prodotto viene conservato a temperatura di 1+10 °C</p>			
Commercializzazione	Viene commercializzato generalmente confezionato in un involucro cartaceo per alimenti				